

ALTATÁSRA, REGIONÁLIS ÉS HELYI ÉRZÉSTELÉNÍTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Betegünk!

Szíveskedjen az alábbi tájékoztatót elolvasni!

A tervezett műtétet megelőzően ön először az aneszteziológiai ambulancia előkészítő munkája során, majd közvetlenül a műtét előtti napon találkozik osztályunk altató orvosával.

A fájdalmas vizsgálatokat, kezeléseket és műtéti beavatkozásokat rendszerint érzéstelenítéssel végezzük. Az érzéstelenítésre, a beavatkozás idejében a légzés, a vérkeringés és egyéb szervek működésének fenntartása az érzéstelenítést végző aneszteziológus orvos illetékes. Munkája a beavatkozást végző, operáló orvossal együttműködve az ön biztonságát szolgálja.

Az érzéstelenítés különböző módszerekkel történhet:

1. Altatás (általános érzéstelenítés)

A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és öntudatvesztéssel társul. Az alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig tartunk fenn.

A műtétet megelőzően már a kórteremben vagy az előkészítőben tabletta vagy injekció formában megkapja az előkészítést. Az osztályon vagy szükséges esetben a műtőben a kéz vénájába infúziót kötünk be, majd az érzéstelenítést általában azon át adott injekcióval kezdjük el. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót megismételjük, vagy altatógázokat adunk arcmaszk, gégemaszk, illetve légcsőbe vezetett cső (tubus) segítségével, amikor ön már alszik. Ezekkel a módszerekkel közvetlenül a tüdőbe juttatjuk az oxigén és altatógázok keverékét.

Az altatás során biztonsági riasztókkal felszerelt, korszerű módszerek (monitor, altatógép) segítenek az ön alapvető élettani működésének fenntartásában.

2. Regionális, helyi érzéstelenítés

A fájdalommentesség a test operálandó/műtendő területére korlátozódik, öntudatvesztéssel nem párosul.

A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza.

Gerincközei (spinális vagy epidurális) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő és az alhas fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy

megadott pontján érzéstelenítőt fecskendezünk az érző idegek közé, vagy köré. Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás gyakorlatilag fájdalommentes.

A kielégítő érzéstelenítés velejárója, hogy az érintett végtagot átmenetileg a műtét alatt nem érzi és nem képes mozgatni a beteg.

Mindkét módszernek vannak előnyei, hátrányai, ezért a tervezett műtét és az ön általános állapota szempontjából a legmegfelelőbbet javasoljuk.

Az érzéstelenítési eljárások veszélyei

Sajnos minden beavatkozás veszélyekkel nem várt következményekkel járhat. Az altatással kapcsolatos súlyos szövődmények azonban még a rossz általános állapotú betegeknél is ritkák. Az általános érzéstelenítéssel a többi szerv működését is biztonságosan fenntartjuk.

Az altatás általános mellékhatásai, szövődményei:

Nagyon gyakori:

- száraz torok,
- átmeneti zavartság, tájékozatlanság,
- hányinger, hányás,
- fejfájás,
- hátfájás,

Gyakori:

- vénagyulladás,
- erős fájdalom műtétet követően,
- átmeneti látászavar,
- szájsérülés,
- verőér véletlen szúrás központi véna biztosításakor,
- nehéz légút biztosítás,
- remegés, hidegrázás.

Kevésbé gyakori:

- fogsérülés,
- gégegörcs,
- gépek meghibásodása,
- véletlen ébrenlét,
- légút biztosítás kivitelezhetetlensége.

Ritka:

- gyógyszerallergia,
- szívmegállás,
- halálozás,

Szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG, stb.) folyamatosan ellenőrizzük.

A regionális, helyi érzéstelenítés mellékhatásai.

A helyi érzéstelenítés egyes típusai kisebb megterheléseket jelentenek a szervezetnek az esetlegesen előforduló, idegsérülések ritkák.

Gyakori:

- fejfájás,
- átmeneti vizeelési zavar.

Kevésbé gyakori:

- derékfájás,
- tályog, epidurális kanülálást követően,
- központi idegrendszer görcsei,
- szívmegállás.

Nagyon ritka:

- alsó testfél bénulás,
- gerinchártya bevérvése,
- halálozás.

Azokat a problémákat, amelyek önnél nagyobb eséllyel fordulhatnak elő, az altatóorvos mondja el részletesen az első találkozásuk alkalmával.

Kérjük, hogy a műtét előtt saját érdekében tartsa be a következőket:

- A műtét kezdete előtt ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon!
- A pontos időpontot altató orvosa határozza meg:
.....órákor még ihat
.....órákor még ehet könnyen emészthető ételt
- Kivehető fogprotézisét, kontaktlencsáját távolítsa el, hallókészülékét tartsa magán!
- Ékszereit vegye le, mossa le a körömlakkot, szemfestéket!
- Testékszereit (piercing) távolítsa el!
- Kérdezzen!

A műtétet követően, amennyiben ambuláns/egynapos beavatkozás történt:

- A műtétet követően az ön elbocsátásának számos feltétele van.
- Csak akkor bocsátjuk el, ha
 - nincs sebészeti probléma
 - Az ön tudata, ítélőképessége tiszta,
 - önállóan képes járni,
 - tud önállóan vizet inni, vizeletet üríteni, nincs hányingere,
 - fájdalma egyszerű fájdalomcsillapítókkal jól csillapítható.
- Az érzéstelenítést követően járó betegként nem ajánlatos az utcán egyedül közlekedni. Hozzá tartozói kíséretében vagy taxival térjen haza.
- Szükség esetén gondoskodni kell az ön otthoni ellátásáról, ápolásáról.
- Az altató utóhatása miatt leghamarabb csak 24 óra elteltével vehet részt aktívan az utcai forgalomban, dolgozhat, gépen fogaszthat alkoholt, tanácsos szerződést, megállapodást kötnie.
- Ételt, italt mértéktartóan fogyasszon a műtét napján.
- Fájdalomcsillapításra a szokványos gyógyszerei alkalmasak, hacsak az altatóorvos egyéb készítményt nem ajánl.

Ha bármit részletesen szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától a műtét előtti találkozáskor!

Név:

Születési idő: év hó nap

Anyja neve:

Lakcím:

TAJ-szám: - -

Beleegyezés vagy megtagadás

Beleegyezés

Amikor ön a beavatkozáshoz írásos beleegyezését adja, akkor egyúttal kijelenti, hogy az altatás, regionális és helyi érzéstelenítés szükségességéről, céljáról és esetleges veszélyeiről az ön által kért felvilágosítást megkapta, az abban foglaltakat egészében megértette és tudomásul vette. Kezelőorvosa részletesen, személyére vonatkozóan, érthető szóhasználatával felvilágosította. Tudomásul veszi, hogy az altatást, regionális és helyi érzéstelenítést gyógyulása érdekében szükséges elvégezni. Megérti, hogy az altatásra, regionális és helyi érzéstelenítésre vonatkozó szigorú szakmai előírások betartása ellenére a beavatkozás veszélyeket is rejthet magában. Mindezek alapján egyetért azzal, hogy kezelőorvosa, az altatást, regionális és helyi érzéstelenítést önön végrehajtsa.

Megtagadás

Önnek jogában áll az altatás, regionális és helyi érzéstelenítés megtagadása. Ez esetben írásos nyilatkozatával felmenti orvosait a felelősség alól. Az altatás, regionális és helyi érzéstelenítés elmaradásából eredő állapotrosszabbodásért a felelősséget magára vállalja.

Fenti tájékoztató elolvasása után, írásos nyilatkozatának megtétele előtt forduljon kérdéseivel kezelőorvosához, vagy az altatást, regionális és helyi érzéstelenítést végző orvoshoz!

A rendelkezésemre bocsátott tájékoztató, illetve kezelőorvosomtól kapott felvilágosítás alapján az altatás, regionális és helyi érzéstelenítés szükségességét és a beavatkozással kapcsolatban esetlegesen felmerülő szövődményeket tudomásul vettem, annak rajtam/hozzá tartozómon történő elvégzésébe

beleegyezem / nem egyezem bele.

Megtagadáskor a beavatkozás elmaradásából származó következményekért a felelősséget vállalom, az alól kezelőorvosaimat felmentem.

Orosháza,év.....hónap.....nap

.....

felvilágosítást végző orvos

.....

beteg/törvényes képviselő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás: