

Intravénás infúzió

Az infúzió adásának célja

Folyadékpótlás, különböző ásványi anyagok, gyógyszerek bevitele, a keringő vér mennyiség időleges pótlása, vénás táplálás.

Az infúzió előnye:

Nagy mennyiségű folyadékot tudunk lassú áramlással bevinni a szervezetbe. Alkalmas arra is, az infúzióban oldott gyógyszerek pontos adagolhatóságával egyenletes gyógyszerhatást érjünk el. Bármely felületen vénába adható, leggyakrabban a könyök vénák egyikébe adjuk, ritkábban a nyak, vagy a kézfej vénáiba.

Az infúzió kivitelezése

Az infúziót e célra készült, steril és pyrogén (lázkeltő) anyagoktól mentes szerelékkel juttatjuk a beteg szervezetébe, az orvos által meghatározott cseppszámban. A szerelék szűrőzsákkal és cseppadagolóval ellátott, zárt rendszer. Az infúzió bármely felületen vénába adható. Leggyakrabban a könyök vénák egyikébe adjuk, ritkábban a nyak, vagy a kézfej vénáiba.

A bejuttatás módja többféle lehet. Egyszerű vénaszúrás esetén a vérvételes tűre csatlakoztatjuk a szereléket. Várhatóan többszöri infúzió igénye esetén tartós kanül is használható. Ilyenkor vastag tűn át, a vénaszúrás követően kanült (műanyag vékony cső) tolunk fel a vénába, mely ellenőrzés mellett 72 óráig, vagy tovább is használható. Gyengén fejlett, szakadékos vénák, rossz általános állapot esetén nagyobb (könyökhajlati, nyaki) vénák sebészi feltárása is szükségessé válhat. E feltárást vénapreparálásnak nevezzük, melynek során ugyancsak műanyag kanül beültetése történik.

Az infúzió esetleges szövődményei:

A rögzített tű kicsúszhat a vénából, ha a beteg behajlítja, mozgatja a karját. Ilyenkor a tű környéke megduzzad, fájdalmassá válik. Vénás kanülok behelyezése esetén vénagyulladás alakulhat ki. Megelőzésükben fontos a rendszeres ellenőrzés. A tű, illetve a kanül eltávolításával, borogatással, szükség esetén antibiotikum adásával a szövődmények jól kezelhetők.

A szövődmények ritkák, kezelhetők, elkerülésük érdekében a beavatkozást végző egészségügyi dolgozók a szakma szigorú szabályai szerint járnak el. Az infúzió alatt vagy azt követően fellépő panaszait jelezze az ápoló személyzetnek, illetve orvosainak.

Beleegyezés vagy megtagadás

Beleegyezés

Amikor Ön az infúzióhoz írásos beleegyezését adja, akkor egyúttal kijelenti, hogy az infúzió céljáról és esetleges veszélyeiről az Ön által kért felvilágosítást megkapta, az abban foglaltakat egészében megértette és tudomásul vette. Kezelőorvosa részletesen, személyére vonatkozóan, érthető szóhasználatkal felvilágosította. Tudomásul veszi, hogy az infúzió adása gyógyulása érdekében szükséges. Megérti, hogy a szakma szigorú szabályainak betartásával is az infúzió veszélyeket is rejthet magában. Mindezek alapján egyetért azzal, hogy kezelőorvosa, az Ön esetében infúziós kezelést alkalmazzon.

Megtagadás

Önök jogában áll az infúziós kezelés megtagadása. Ez esetben írásos nyilatkozatával felmenti orvosait a felelősség alól. Az infúziós kezelés elmaradásából eredő állapotrosszabbodásért a felelősséget magára vállalja.

Fenti tájékoztató elolvasása után, írásos nyilatkozatának megtétele előtt forduljon kérdéseivel kezelőorvosához, az ápolószemélyzethez vagy az infúziót elrendelő orvoshoz!

Alulírott:

Név:

Születési idő: év hó nap

Anyja neve:

Lakcím:

TAJ-szám: - -

a rendelkezésemre bocsátott tájékoztató illetve kezelőorvosomtól kapott felvilágosítás alapján Az infúziós terápia szükségességét és a beavatkozással kapcsolatban esetlegesen felmerülő szövődményeket tudomásul vettem, annak rajtam/hozzá tartozómon történő elvégzésébe

beleegyezem / nem egyezem bele.

Megtagadáskor a beavatkozás elmaradásából származó következményekért a felelősséget vállalom, az alól kezelőorvosaimat felmentem.

Orosháza,

.....
felvilágosítást végző orvos

.....
beteg/törvényes képviselő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Cím:

Cím: